

Avertissements agricoles

POITOU
CHARENTES



BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 143 (15/88) du 24 AOUT 1988

LUZERNE PORTE GRAINE : Intervenir contre les punaises
COLZA : Desherbage

LUZERNE PORTE GRAINE

Stade gousses vertes à maturité (Certaines parcelles récoltées).

Situation :

Recrudescence de l'activité des **punaises mirides** sur l'ensemble de la région. Ces insectes sont présent à **des niveaux importants**.

Préconisation :

Dans les parcelles à plus de 15 jours de la récolte, intervenir **rapidement** avec endosulfan à 1.000 g m.a./ha.

COLZA

DESHERBAGE DU SEMIS A LA LEVEE

La technique de base reste l'utilisation de desherbants au semis, soit en pré-semis, soit en post-semis pré-levée de la culture.

On ^{ne} note pas de nouveautés pour la campagne qui s'annonce. (tableau ci-joint).

Contre la capselle, confirmation des programmes efficaces et sélectifs :

Pré-semis (incorporation)	Post-semis jusqu'à 3 jours après semis	Post-levée "cotylédons étalés 1ère feuille poin- tante du colza"
Tréflan 2 l puis Butisan 1,5 l		
Devrinol 2 à 2,2 l puis Butisan (Selon type de sol) 1,5 l		
	Butisan 1,5 l puis Butisan 1,5 l	

- La réduction ou le fractionnement de la dose Butisan améliore la sélectivité.
- Si l'on craint une forte infestation de capselles, il est préférable de choisir le fractionnement de Butisan.
- Le programme Devrinol Butisan est plus complet sur géraniums.

(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.

753



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL
DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la Forêt - BIARD
86000 POITIERS Tél : 49 58 39 02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes
Directeur Gérant : ~~XXXXXXXXXX~~ J.P. PIQUEMAL
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel : 145 F.
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

HERBICIDES COLZA UTILISABLES AU MOMENT DU SEMIS

	Matière active	Spécialité commerciale	Dose/Ha de spécialité	OBSERVATIONS
PRE - SEMIS	diallate	AVADEx	3,5 à 4 L	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporation immédiate après application • Actif uniquement sur graminées • Dose de 4 L si folle-avoine et repousses céréales
	trifluraline	nombreuses spécialités dont TREFLAN	2,5 L	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporation immédiate après éparillage • Actif sur graminées, sauf repousses de céréales • Actif sur dicotylédones
	napropamide	DEVRIOL FL	2,2 à 2,8 L	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporation superficielle dans les 2 jours (sauf si pluies importantes) • Actif sur graminées : sauf folle-avoine et repousses céréales • Actif sur dicotylédones : dont GAILLETS, MATRICAIRES • La dose de 2,8 L est une dose maximum à n'utiliser qu'en sol argileux (+ 25 % argile) (risque phytotoxicité sur la culture suivante)
	nitralin + napropamide	ZULAN FULTON	2,5 Kg	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporation superficielle dans les 2 jours • Actif sur graminées : (proche de napropamide) • Actif sur dicotylédones : dont MATRICAIRES
PRE-SEMI ou PRE-LEVEL	tébutame	COMODOR	4 à 5 L	<ul style="list-style-type: none"> • En pré-semis, incorporation uniquement si sol pierreux • Actif sur graminées : 5 L en pré-semis si risque repousses de céréales • Actif sur dicotylédones
PRE - LEVEL	dimétachlore	TERIDOX	2 à 3 L	<ul style="list-style-type: none"> • Risque de phytotoxicité (surtout en terres légères) utiliser 2 L • Actif sur graminées : sauf folle-avoine, repousses céréales • Actif sur dicotylédones : dont MATRICAIRES, CAPSELLES
	métazachlore	BUTISAN S	2,5 L	<ul style="list-style-type: none"> • A n'utiliser qu'en conditions de semis favorables (préparation de sol, date et profondeur de semis). Même dans ces conditions la sélectivité peut être insuffisante. • Utilisation préférable immédiatement après le semis : possible jusqu'à 3 jours après • Très bonne efficacité herbicide • Actif sur graminées sauf repousses céréales et folle-avoine • Actif sur nombreuses dicotylédones : dont MATRICAIRES, CAPSELLES
POST-LEVEL PRECOCL	métazachlore	BUTISAN S	3 L	<ul style="list-style-type: none"> • A utiliser dès le stade "cotylédons étalés-1ère feuille pointante du colza" • La firme préconise ce type d'application pour les semis en conditions difficiles • Ce type d'utilisation est efficace sur : CAPSELLES